

# L'INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA PER UN'ASSISTENZA DI COMUNITÀ

**22 giugno 2022**

**ROMA** Regione Lazio Sala Tevere



# Il PDTA dell'epatopatia cronica: aspetti integrati dell'intervento sociosanitario



## PDTA

I Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) sono uno strumento di gestione clinica per la definizione del migliore processo assistenziale finalizzato a rispondere a specifici bisogni di salute, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili sull'argomento, adattate al contesto locale, tenute presenti le risorse disponibili.



## ***CIRROSI EPATICA***: VIII<sup>^</sup> causa di morte

- Mortalità aumentata del 45% negli ultimi 20 anni
- Compensata: rischio > 4.7 volte
- Scompensata: rischio > 10 volte



## EZIOLOGIA

- EPATITE C 26%
- EPATITE ALCOLICA 21%
- EPATITE C +EPATITE ALCOLICA 15%
- NAFLD 18%
- EPATITE B 15%



# INTEGRAZIONE

- OSPEDALE- TERRITORIO
- MMG- SPECIALISTA



## Assistenza domiciliare

Compensato con condizioni compatibili  
presenza familiare  
valutazione dell'autosufficienza



## PDTA EPATOPATIA CRONICA

- EPATOLOGO: Stadiazione, monitoraggio, scelte terapeutiche
- MMG: Informazioni su patologie e terapie in corso, condizioni familiari





# COUNSELING

- La cirrosi è una condizione cronica da non intendersi come malattia terminale
- Modifica dello stile di vita: alcol, dieta, attività fisica
- Rischio infettivo



# ENCEFALOPATIA EPATICA PORTO-SISTEMICA

Disfunzione cerebrale, definita come la presenza di alterazioni neuropsichiche conseguenti all'insufficienza epatica e a shunt porto sistemico, che si manifesta con un ampio spettro di alterazioni neurologiche e la cui diagnosi richiede l'esclusione di malattie cerebrali . L'encefalopatia epatica si caratterizza per le modifiche della personalità, per le alterazioni cognitive e per un ridotto livello di coscienza .

Presenta diversi gradi da encefalopatia minima a grado I sino al IV

Fattori precipitanti



# ENCEFALOPATIA EPATICA

- IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE (PERDITA DI LAVORO, DEMANSIONAMENTO) SUL PAZIENTE E SU CHI LO ASSISTE



## EEPS

- Seconda causa di ospedalizzazione nel cirrotico
- Forma minima 70% cirrotici
- Forma conclamata 30% cirrotici



## PATOGENESI

L'ipotesi dell'ammonio L'ammoniaca è prodotta nel tratto gastrointestinale dalla degradazione batterica di ammine e amminoacidi; Normalmente, l'ammoniaca viene poi detossificata nel fegato. Nella cirrosi vi è una diminuzione degli epatociti funzionanti con conseguente riduzione delle possibilità di disintossicazione dell'ammoniaca e, in secondo luogo, lo shunt portosistemico può deviare il sangue contenente ammoniaca dal fegato alla circolazione sistemica.

Ruolo fondamentale del microbiota intestinale

Reversibile? (forma minima 70% cirrotici)



## TRATTAMENTO, PREVENZIONE E PROFILASSI

- Rimozione fattori scatenanti
- Disaccaridi non assorbibili: lattulosio e lattitolo
- Antibiotici non assorbibili: Rifaximina 550 mg, metronidazolo, vancomicina
- Aminoacidi a catena ramificata
- Modifica della flora intestinale
- Dieta



## FASE TERMINALE

- Trattamento dei sintomi
- Sostegno psico-emotivo del paziente e dei familiari



## STIMA DISABILITA'

- 25 milioni di malati cronici
- 14 milioni di multicronici
- Spesa SSN > 70 miliardi di euro





## NECESSITA'

- Clinico assistenziali
- Difficoltà ambientali
- Difficoltà della famiglia



Care Management



MEDICINA PERSONALIZZATA



Telemedicina



# FAMIGLIA



P D T A



GRAZIE

